

ความชุกและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์การติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับในประชาชนกลุ่มเสี่ยง เขตรับผิดชอบ
โรงพยาบาลภูสิงห์ อำเภอกุสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ

ปิยรัตน์ ชาวนา*

*นักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ

โทรศัพท์ 09-3328-4817 E-mail.com: piyarat_w60@hotmail.com

บทคัดย่อ

การวิจัยแบบภาคตัดขวางเชิงวิเคราะห์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความชุกและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์การติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับในประชาชนกลุ่มเสี่ยง เขตรับผิดชอบโรงพยาบาลภูสิงห์ อำเภอกุสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 293 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นระหว่างเดือนมกราคม 2569 ถึง มีนาคม 2569 และการตรวจอุจจาระด้วยวิธีมาตรฐาน (Kato-Katz) เพื่อยืนยันการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา นำเสนอข้อมูลโดยใช้ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 25 เพอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 75 และวิเคราะห์ความชุกและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์การติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับในประชาชนกลุ่มเสี่ยง เขตรับผิดชอบโรงพยาบาลภูสิงห์ อำเภอกุสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยใช้การวิเคราะห์การวิเคราะห์ถดถอยแบบพหุเชิงซ้อน (Multiple linear regressions) ด้วยวิธี Stepwise ผลการศึกษาพบว่า ความชุกของการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับในกลุ่มตัวอย่างพบร้อยละ 1 โดยปัจจัยที่มีความสัมพันธ์การติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับในประชาชนกลุ่มเสี่ยง เขตรับผิดชอบโรงพยาบาลภูสิงห์ อำเภอกุสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ได้แก่ พฤติกรรมการบริโภคปลาน้ำจืดดิบหรือสุก ๆ ดิบ ๆ อายุ การมีสมาชิกในครอบครัวติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับ พฤติกรรมการป้องกันโรคที่ไม่เหมาะสม จากผลการวิจัยควรส่งเสริมการปรับพฤติกรรมการบริโภคอาหารสุก สร้างความรู้เรื่องพยาธิใบไม้ตับ คัดกรองเชิงรุกในกลุ่มเสี่ยง สนับสนุนครอบครัวเฝ้าระวัง และพัฒนามาตรการป้องกันโรคอย่างต่อเนื่องในชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ

คำสำคัญ : ความชุก ปัจจัย พยาธิใบไม้ตับ ประชาชนกลุ่มเสี่ยง